© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

der Hauptjahresringe, welche jedoch in dem Grade abgestossen, je älter selbe sind; zwischen diesen Reihen einzelne, wenig regelmässig gestellte, warzenartige Erhöhungen. Die Jahresringe, wie alle Ränder, unregelmässig auf und niedergebogen oder ausgeschnitten. Der Vorderrand niedriger, spitz-, der Hinterrand breitzugerundet. — Länge 1″, 9‴; Höhe 1″, 3‴.

Das grosse Exemplar aus dem Nil bei Nedi stimmt in den allgemeinen Umrissen mit vorigem überein, nur dass der Hinterrand etwas geschnabelt, die Ligamentspalte und Schlossplatte (welch letztere aus eben so zahlreichen, bogigen Querlamellen besteht, als die Schale Schichten besitzt) horizontaler gelegen und grösser (diese 16‴ lang) und von den oben erwähnten Falten keine Spur mehr vorhanden ist. Das Gehäuse innen und Aussen ganz perlmutter, abgerieben, ungleichschalig, die rechte Schale tief, grubig uneben, am einwärts gestülpten Schilde und an der Abdominalwölbung am dicksten (9‴), die linke flacher (deckelartig), mit aufgerichtetem Schilde und stumpfer Rückenleiste, die um den Muskeleindruck herumbiegt; der vordere Muskeleindruck stark — fast sichelförmig gebogen, schmal, von 13‴ Länge, der hintere Eindruck (v. 9‴ Länge) breiter, wenig gebogen, fussförmig. Die Schalen zeigen zwischen den überaus zahlreichen, wellig gebogenen Ablagerungsschichten elliptische Spalten, an der Innenseite durch eine oder mehrere Schichten gehende Löcher. Die Epidermis, soweit davon noch Spuren vorhanden, scheint ockergelb gewesen zu sein. — Länge 3½″; Höhe 3″. —

Tausch-Catalog

der deutschen malacozoologischen Gesellschaft.

N. B. Die Preise in Reichsmark per Stück.

	ℳ		ℳ
Helix			
similaris, Fér.	0,60	californiensis, Lea	0,70
pyramidalis, Wag.	0,60	devia, Gould	1
polygyrata, Born	4	Dupetitthouarsi, Desh.	0,60
brasiliana, Desh.	1,50	exarata, Pfr.	0,50
helicycloides, D'Orb.	1,50	fidelis, Gray	0,70
arrosa, Gould	0,80	facta, Newcomb	0,80
columbiana, Lea	0,70	infumata, Gould	1

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

	ℳ		ℳ
Kelletti, Forb.	0,60	Mooreana, Binney	0,70
loricata, Gould	0,50	stenotrema, Fér.	0,60
Newberryana, Bin.	0,80	spinosa, Lea.	1.20
reticulata, Pfr.	0,60	Troostiana, Lea	0,80
Stearnsiana, Gabb.	1	Rugeli, Shuttlew.	1.20
Townsendiana, L.	1.20	suppressa, Lea.	0,70
tudiculata, Binn	2	multilineata, Say	0,60
Traskii, Newcomb.	3	Mitcheliana, L.	1
Tryoni „	1.20	uvulifera, Shuttlew.	0,50
Vancouverensis, L.	1	lævigata, Pfr.	0,80
chersina, Say	0,50	unidentata, Chemn.	0,60
striatella, Anth.	0,50	rectangula, Pfr.	0,50
Binneyana, Morse.	0,80	Swainsoni, „	0,40
exigua, Stimpson.	0,50	trochiformis, Fér.	0,40
asteriscus, Morse.	0,40	pennsylvanica, Gr.	0,80
texasiana, „	0,50	fringilla, Pfr.	0,80
varians, Mke.	0,50	vittata, Müll., Ceylon	0,60
Caldwelléi, Bens.	0,70	notabilis, Shuttlew., W.-Ind.	0,50
cubensis, Pfr.	0,80	cicatricosa, Müll., China	0,40
auriformis, Bland.	1.50	Phönix, Pfr., Ostindien	0,80
auriculata, Say	1.50	hæmastoma, L., Ceylon	0,30
arborea, Say	0,40	Valenciennesii, Guill.	1
barbigera, Redf.	3	Tranquebaria, Fabr. Ostindien	0,80
Carpenteriana, Bld.	0,80	semirugata, Beck., „	0,80
cumberlandiana, L.	1	muscarum, Lea, Cuba	0,50
demissa, Binney	1.20	badia, Fér., Martinique	0,50
Febigeri, Bland	1.20	dentiens, Fér., „	0,60
gularis, Say	0,50	ligulata, Fér., Madras	0,80
Huzardi, Bland	1.50	bifasciata, Burr., Brasilien	0,50
interna, Say	0,60	Incei, Pfr., Australien	1.50
indentata, Say	0,80	Grayi, „ „	1
Leaii, Ward.	0,80	Mackenzii, Val., Japan	1.50
labyrinthica, Say	0,30	*Cochlostyla.*	
lineata, Say	0,40	Dryas, Brod., Philippinen	1
limatula, Ward.	0,60	Luzonica, Sow., „	0,60
pustula, Fér.	0,70	„ v. ovoidea. „	0,70
Sayii, Binney	3	cincinna, Sow., „	0,60
Römeri, Pfr.	3	„ varietates „	0,60
obstricta, Say	0,60	Roissyana, Fér., „	0,30
septemvolva, Say	0,30	*Nanina*	
cereolus, Mühlf.	0,50	ovum, Val. Ostindien 1 bis	1.50
Hopetonensis, Sh.	0,60	Humphreysiana, Lea, Singapore	0,60
Kopnodes, Binney	1.20	troilus, Gould, Samoa-Inseln	0,40

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

		Mk.
planorbis, Lesson,	Tahiti	0,40
nigritella, Pfr.,	„	0,40
cressida, Gould,	Huahin-Inseln	0,40
Clausilia		
Reiniana, Kob.,	Japan	3
Pupina		
japonica, A. Ad.,	Japan	1
Balea		
variegata, A. Ad.,	Japan	1
Bulimus		
angiostomus, Wag.		1.25
bahiensis, Mer.		2
bilabiatus, Brod.		1
calcareus, Born		1.20
durus, Spix		0,80
exilis, Gmel.		0,30
almeida Spix		0,80
albus, Sow.		0,50
Largillierti, Phil.		1
naviculus, Wag.		1
pubescens, Mor.		1
peruvianus, Br.		1.20
argutus, Pease.		0,80
dealbatus, Say		0,60
elongatus, Bolten		1
auris leporis, Brug.	Rio J.	0,60
fulvicans, Pfr.,	Sichellen	1
strigilosus, „	„	0,70
pudicus, Müll.,	Brasilien	1
morosus, Gould,	Viti-I.	1.20
Persa		
costata Q. & G.,	Viti-I.	0,80
melanostoma, Gol.,	Viti-I.	0,50
Physa		
parvula, Mouss.,	Viti-I.	0,20
Cyclotus		
blanchetianum, M.		0,80
Cyclostoma		
hæmastoma, Anton		0,75
Michaudi, Grat.		2

		Mk.
Tudora		
versicolor, Pfr.		0,60
megacheila, Pfr.		0,80
Helicina		
Maugeriæ, Gray		0,25
rubicunda, Pease		0,50
orbiculata, Say		0,20
Rohri, Pfr.		0,30
submarginata, Gr.		0,25
Sloanei, D'Orb.		0,40
variabilis, Wag.		0,40
buzelina, Gould,	Viti-I.	0,25
solida, Pease,	Tahiti	0,20
flavescens, Pease,	Cooks-I.	0,30
„ „	Karstings-I.	0,30
Vitiensis, Mouss.,	Viti-I.	0,25
Streptaxis		
dejecta, Petit		1
Cylindrella		
elegans, Pfr.		0,50
crispula „		0,80
fastigiata, Gund.		1.20
cyclostoma, Pfr.		1.20
Partula		
hyalina, Brod.		0,60
hebe, Pfr.		0,80
glutinosa, Pfr.		0,60
rubiginosa, Reeve		0,60
trilineata, Pease		0,60
und ca. 12 bestimmte Species von den Südsee-Inseln à St.		0,40
Achatinella		
citrina, Migh.		0,80
radiata, Gould		1
bacca, Reeve		1
Melampus		
fasciatus, Desh.,	Viti-I.	0,20
semisulcata, Mouss.,	„	0,20
striata, Pease,	Tahiti	0,20
6 unbenannte Sps.	Viti-I. à St.	0,20

Schwanheim a. M. T. A. Verkrüzen.